Información para los padres
De niños en edad escolar

Impétigo

Su hijo(a) tiene sarpullido que puede ser impétigo.

Las instrucciones que se encuentran a continuación pueden ayudarle controlar este problema de salud en su casa.

El impétigo es una infección de la piel causada por una bacteria que frecuentemente infecta llagas, picadura de insectos y otros sarpullidos de piel.

Si su hijo(a) tiene una o dos llagas pequeñas de impétigo, se puede tratarlas con una pomada de antibiótico triple o crema que se puede comprar sin receta. Pídale a al farmacéutico que le ayude a escoger una que sea buena para su hijo(a). Lea y siga las instrucciones de la etiqueta de la medicina.

Antes de aplicar la medicina, remueva las costras (si las hay) al remojar las llagas en agua tibia por 5 minutos. Después de remojarlas, lave las llagas con una toallita, agua tibia y jabón antibacterial como DialTM o SafeguardTM.

Si su hijo(a) tiene impétigo en la nariz, puede ser necesario que ponga una cantidad pequeña de pomada en un hisopo y que la aplique a las llagas en la nariz. Su hijo (a) también necesitará visitar al médico o una enfermera certificada.

Lávese las manos antes y después de tocar las llagas. El impétigo se puede contraer de una persona a otra.

Mantenga la toalla y las toallas para asearse de su hijo(a) separadas de las de los otros miembros de la familia. Lave las toallas, las toallas para asearse, las sábanas y la ropa con agua caliente. Seque en una secadora a temperatura alta o en el sol.

Mantengas las uñas de su hijo(a) limpias y cortas para que no se arañe y contagie el sarpullido.

Cubra las llagas si están supurando o drenando.

Si las llagas no pueden ser cubiertas, su hijo(a) tendrá que quedarse en casa.

- Su hijo puede regresar a la escuela o cuidado infantil 48 horas después de que el tratamiento con antibióticos haya sido iniciado y las heridas hayan empezado a cicatrizar.

Llévele a su hijo(a) al médico o la enfermera certificada si:

- El sarpullido no se mejora después de 1 a 2 días de aplicar la pomada antibiótica.
- Las llagas se ponen rojas, hinchadas o le duelen
- Su hijo empieza a sentirse enfermo
- La temperatura tomada de la boca de su hijo(a) es 101ºF o más alta o 100ºF o más alta tomada debajo del brazo.

Los nombres de las marcas usados en este documento sólo sirven como ejemplos. SCDHEC no promociona cualquier de estas marcas listadas en este documento.

Si las lesiones no pueden ser cubiertas , los niños deben ser excluidos de la escuela o cuidado infantil, hasta que el estudiante haya recibido tratamiento efectivo antimicrobial por 48 horas, las lesiones muestran signos de cicatrización (disminución en el tamaño) y hayan dejado de supurar.

Para mayor información sobre exclusión de un niño que tiene impétigo, vea el DHEC Child Care and School Exclusion Lists of Contagious or Communicable Diseases (Las listas de exclusión de cuidado infantil y escuela por razones de enfermedades contagiosas de DHEC) en http://www.scdhec.gov/health/disease/exclusion.htm

Nombre del niño _____

Enfermera de la escuela _____

Fecha _____

Escuela _____

Número de la escuela (_____) _____

D H E C
PROMOTE PROTECT PROSPER

www.scdhec.gov

Promoviendo y protegiendo la salud del público y del medio ambiente

http://www.scdhec.gov/health/mch/wcs